

Produktbeschreibung

OpSept Classic ist ein gebrauchsfertiges alkoholhaltiges Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Anwendungsgebiet

Anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene und in der häuslichen Pflege.

Wirkspektrum

bakterizid (inkl. MRSA), levurozid

begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)

begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3 ml in die Handfläche geben und für 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass auch Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig benetzt werden. Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Zur chirurgischen Händedesinfektion 3 ml in die Hände einreiben, sodass die gesamte Handfläche einschließlich der Problembereiche Interdigitalbereich und Nagelfalz während 90 Sekunden benetzt ist. Während gesamter Einwirkzeit von 90 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 30 bzw. 90 Sekunden ist die Desinfektion abgeschlossen.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnr.	Gebindegr.	Gebindeart	Verpackungseinh.	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)	HMN (Hilfsmittelnummer)
601121	500 ml	Flasche	18 x 500 ml	18311798	4260181251158	4260181251660	54.99.02.0012



Biozidregistriernummer

N-45060

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
63,14 g Propan-2-ol

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

36 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig
wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in
verschlossenem Zustand an einem gut
belüfteten Ort auf und schützen Sie es
gegen unbefugten Zugriff.

Einwirkzeiten

OpSept Classic	Belastung		Norm	Ein- wirkz.
	hoch	niedr.		
Hygienische Händedesinfektion		x	EN 1500	30 Sek./ 3 ml
Chirurgische Händedesinfektion		x	EN 12791	90 Sek./ 3 ml
Bakterizid		x	EN 13727	30 Sek.
Levurozid		x	EN 13624	30 Sek.
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)		x	EN 14476	15 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)		x	EN 14476	2 Min.

Informationen

zu diesem Produkt



Weiterführende Infor-
mationen finden Sie auf
unserer Homepage
www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen
richten Sie bitte an
info@drdeppe.de



Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen
T +49 (0) 2152 5565-0 W www.drdeppe.de