

Desinfektionsplan Heilpraktiker



*** Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:**

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen. Flächendesinfektionsmittel nicht mit anderen Substanzen mischen; max. Standzeit der abgedeckten, ungetrübten Lösung - 24 h / Tücher Systeme - siehe Anweisung. Bei Unterhalts-Wischdesinfektion kann die Fläche nach Abtrocknung wieder genutzt werden. Bei Schlussdesinfektion lt. VAH / Rki-Listen, Flächen erst nach Einhaltung der gesamten Einwirkzeit wieder nutzen.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Reinigung				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - bei sichtbarer Verschmutzung - nach WC- Benützung - vor Pausen und Dienstschluss 	Lotio Med Soft Professional & Care Lotio Med Sensitive Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - mit Waschlotion und Wasser die Hände waschen - gründlich mit Einmalpapier abtrocknen

Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion	vor: - Patientenkontakt - aseptischen Tätigkeiten nach: - Patientenkontakt - Kontakt mit kontaminiertem Material - Kontakt mit d. Patumgebung - bei Clostridioides difficile - Hepatitis A + E Viren	OpSept virugon®	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> - ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben - gleichmäßig verreiben - auf Fingerkuppen und Nagelbett besonders achten - während Einwirkzeit mit Desinfektionsmittel feucht halten - Hygienische Händedesinfektion und anschließend Händewaschung vornehmen
Hautdesinfektion	- talgdrüsenarme Haut	OpDerm	gebrauchsfertig / mind. 15 Sekunden	Hautareal mit Desinfektionsmittel besprühen oder mit einem getränkten keimarmen Tupfer abreiben; auf satte Benetzung achten. Einwirkzeit einhalten. Bei längerer Einwirkzeit Vorgang wiederholen. Einwirkzeiten je nach Indikation sind zu beachten.
	- talgdrüsenreiche Haut	OpDerm	gebrauchsfertig / mind. 3 Minuten	Hautareal mit Desinfektionsmittel besprühen oder mit einem getränkten sterilen Tupfer abreiben; auf satte Benetzung achten. Einwirkzeit einhalten. Bei längerer Einwirkzeit Vorgang wiederholen. Einwirkzeiten je nach Indikation sind zu beachten.

Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händepflege / Hautschutz	- so oft wie möglich	Lotio Lind Professional & Care Lotio Protect Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - Hände sorgfältig eincremen - Produkte siehe „Hautschutzplan“

Desinfektion Fläche*				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Behandlungs- und Massageliegen	- arbeitstäglich - nach Kontamination - für jeden Patient wird eine frische Textilunterlage genutzt	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	<ul style="list-style-type: none"> - desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Lagerungshilfsmittel: z.B. Nackenrolle, Kissen, Knierolle	- arbeitstäglich - nach Kontamination - für jeden Patient wird eine frische Textilunterlage genutzt	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	<ul style="list-style-type: none"> - desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift

Desinfektionsplan Heilpraktiker



Desinfektion Fläche*		Konzentration / Einwirkzeit		WIE
WAS	WANN	WOMIT		
Sitzflächen: z.B. Hocker, Bänke, Stühle, Rollstühle	- arbeitstäglich - nach Kontamination	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Fangopacks, Kühlpacks	- nach jedem Patientenkontakt - für jeden Patient wird eine frische Textilhülle genutzt	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
Flüssiger Fango	- für jeden Patient wird eine neue Folie und Textilhülle genutzt	Fango-Rührwerk	130°C / ca. 40 Minuten	- die benutzte Fango-Masse wird einmal täglich für ca. 40 Minuten auf 130°C erhitzen (Sterilisationsphase)
		Individuelle Aufbereitung		- Die Aufbereitung ist abhängig vom eingesetzten System. Die Herstellerinformationen sind zu beachten.
Arbeitsflächen, Schränke, offene Regale	- Arbeitsflächen: vor und nach Benutzung - Schränke: innen: monatlich außen: wöchentlich - offene Regale: wöchentlich	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Fußboden	- arbeitstäglich			- Bodenreiniger: feucht wischen
Schluss- / Wisch-Desinfektion lt. VAH/RKI *	nach speziellen Erregern	ausgewiesene Mittel lt. Listen		- siehe Liste Schluss- / Wischdesinfektion lt. VAH/RKI

Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Schutzhandschuhe	- gezieltes Tragen, wenn Kontamination erwartet wird			- Schutz vor Verschmutzung. Verhindert nicht den Keimdurchtritt. Nach Ablegen hygienische Händedesinfektion beachten.

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift