

Desinfektionsplan Mobile ambulante Pflege



* Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion auch bei Adenoviren (-Verdacht)	- vor Patientenkontakt - vor aseptischen Tätigkeiten - nach Patientenkontakt - nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material (z.B. Blut); auch nach Ablegen von Handschuhen - nach Kontakt mit der Patientenumgebung	OpSept virugon*	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Weitere Informationen siehe Hygieneplan Händehygiene.

Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hautpflege	- bei Bedarf mehrmals täglich - am Arbeitsende	Lotio Lind Professional & Care Lotio Protect Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	siehe Hygieneplan Händehygiene

Desinfektion Fläche*				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Arbeitsflächen beim Patienten	- nach Rücksprache mit dem Patienten - bei sichtbarer Verschmutzung sofort	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.
Nicht patientenbezogene Hilfsmittel (z.B. Blutdruckmessgerät, Stethoskop)	- direkt nach Patientenkontakt	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.
Kontaktflächen Hände im Auto	- bei Bedarf mehrmals täglich	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.
Patienten Dokumentationsmappen	- bei Bedarf mehrmals täglich - nach Verlassen der Patientenwohnung	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.
Pflegetasche (innen und außen)	- bei sichtbarer Verschmutzung sofort - bei Bedarf mehrmals täglich	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.
Oberflächen empfindlicher Gegenstände (z.B. Mobilphone, Tablet, Monitore)	- bei sichtbarer Verschmutzung sofort - täglich	Beta Guard rfu Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.

Sonstiges

WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Medizinische Einmalhandschuhe (geprüft nach DIN EN 455 und DIN EN 374)	Gezieltes Tragen, wenn Kontamination erwartet wird.			Schutz vor sichtbarer Verschmutzung, verhindert nicht den Keimdurchtritt. Nach dem Ablegen hygienische Händedesinfektion erforderlich.

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift

Desinfektionsplan Mobile ambulante Pflege



Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
PE-Schürze	Wenn die Arbeitskleidung (Front) kontaminiert oder durchnässt werden kann.			Über der Dienstkleidung tragen, nach Gebrauch entsorgen.
Schutzkittel (nach DIN EN 14126 geprüft)	Wenn die Arbeitskleidung kontaminiert oder durchnässt werden kann.			Über der Dienstkleidung tragen, nach Gebrauch entsorgen.
FFP2 Maske	Bei Verdacht oder Vorliegen von aerogen übertragbaren Infektionskrankheiten.			Auf korrekten Sitz der Maske achten, ggf. testen. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
Mund-Nasen-Schutz	Bei Verdacht oder Vorliegen von Tröpfchen übertragbaren Infektionskrankheiten.			Auf korrekten Sitz der Maske achten. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
Augenschutz (dicht schließende Schutzbrille nach DIN EN 166 geprüft)	Zum Schutz der Augen und Schleimhäute vor Tröpfchen, Sekreten oder Chemikalien.			Auf korrekten Sitz achten.
Abfälle	- Hausmüllähnliche Abfälle - spitze, scharfe oder zerbrechliche Gegenstände - mit Blut oder Sekreten behaftete Abfälle			Entsorgen: - sofort nach Entstehung - entsprechend den kommunalen oder anderen Bestimmungen, getrennt nach Abfallarten - in durchstich- und bruchsicheren, sowie feuchtigkeitsbeständigen Behältnissen - in feuchtigkeitsbeständigen Abfallsäcken im Abfalleimer

Datum Erstellung Unterschrift

Datum Prüfung Unterschrift

Datum Freigabe Unterschrift