

Desinfektionsplan Praxis für Podologie



*** Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:**

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen. Flächendesinfektionsmittel nicht mit anderen Substanzen mischen. Bei Unterhalts-Wischdesinfektion kann die Fläche nach Abtrocknung wieder genutzt werden.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Reinigung				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - bei sichtbarer Verschmutzung - nach WC-Benutzung - vor Pausen und Dienstschluss 	Lotio Med Soft Professional & Care Lotio Med Sensitive Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - mit Waschlotion und Wasser die Hände waschen - gründlich mit Einmalpapier abtrocknen

Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion	vor: - Patientenkontakt - aseptischen Tätigkeiten nach: - Patientenkontakt - Kontakt mit kontaminiertem Material - Kontakt mit der Patientenumgebung	OpSept virugon®	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> - ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben - gleichmäßig verreiben - auf Fingerkuppen und Nagelbett besonders achten - während EWZ mit Desinfektionsmittel feucht halten
Hautdesinfektion	- Hautdesinfektion beim Abtragen von Hornhaut u. ä.	OpDerm	gebrauchsfertig / mind. 15 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> - Hautareal mit Desinfektionsmittel besprühen oder mit einem getränkten keimarmen Tupfer abreiben; auf satte Benetzung achten. Einwirkzeiten einhalten.
Wunddesinfektion	- Desinfektion von Wunden			<ul style="list-style-type: none"> - Schleimhaut- und Hautpartien im Anwendungsbereich müssen gleichmäßig und gründlich mit dem Antiseptikum benetzt werden Tupfermethode: Schleimhaut- und Hautflächen mit getränkten Tupfern unter aseptischen Bedingungen abreiben.

Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händepflege / Hautschutz	- so oft wie möglich	Lotio Lind Professional & Care Lotio Protect Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - Hände sorgfältig eincremen - siehe „Hautschutzplan“

Desinfektion Fläche*				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Medizinisch-technische Geräte, Bedienungselemente / Handstücke	- unmittelbar nach Gebrauch - bei sichtbarer Verschmutzung -Gehäuse täglich	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	<ul style="list-style-type: none"> - desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeiten beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Behandlungsstuhl / -lampe	- unmittelbar nach Gebrauch - bei sichtbarer Verschmutzung	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	<ul style="list-style-type: none"> - nach Patientenbehandlung desinfizierend abwischen und nach Trocknung die Liege mit Liegenpapier überziehen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeiten beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift

Desinfektionsplan Praxis für Podologie



Desinfektion Fläche*				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Arbeitsflächen / PC-Tastatur	Arbeitsflächen: - vor aseptischen Tätigkeiten - nach Gebrauch/Kontamination	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeiten beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Waschbecken	- 1x täglich - bei sichtbarer Verschmutzung	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeiten beachten - Desinfektion nur auf vollständig trockenem Untergrund
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Fußbecken	- unmittelbar nach Gebrauch - bei sichtbarer Verschmutzung	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeiten des Fußbeckens wird mit einer neuen Befüllung unterbrochen - Desinfektion nur auf vollständig trockenem Untergrund
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Schränke	- innen 1x monatlich - außen 1x wöchentlich	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- nach Ausräumen feucht aus- bzw. abwischen - nicht nachtrocknen
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Offene Regale	- 1x wöchentlich	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- nach Ausräumen feucht aus- bzw. abwischen - nicht nachtrocknen
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Schluss- Wisch-Desinfektion lt. VAH/RKI	- nach speziellen Erregern	ausgewiesene Mittel lt. Listen		- nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt



Desinfektion Instrumente**				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Mehrweginstrumente	- nach Gebrauch			- Trockenabwurf in geschlossenen Abwurfbehälter - anschließend Aufbereitung gemäß Hygieneplan

Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Schutzhandschuhe	- gezieltes Tragen, wenn Kontamination erwartet wird			Verhindert nicht den Keimdurchtritt. Nach dem Ablegen ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.
Schutzkittel, Schürze	- Schutz der Dienstkleidung vor Durchfeuchtung oder Verschmutzung			Über der Dienstkleidung tragen und nach Gebrauch entsorgen.
Mund-Nasen-Schutz	- Schutz vor Übertragungen durch Tröpfchen			Auf korrekten Sitz der Maske achten. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
FFP2-Maske	- Schutz vor aerogen übertragbaren Erregern			Auf korrekten Sitz der Maske achten, ggf. testen. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
Schutzbrillen	- Schutz vor Übertragungen durch Tröpfchen - Schutz der Augen beim Umgang mit Chemikalien			Auf einen korrekten Sitz achten. Vor dem Abnehmen ist unbedingt eine Händedesinfektion durchführen.

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift