

Desinfektionsplan Stationäre Pflege



* Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen. Flächendesinfektionsmittel nicht mit anderen Substanzen mischen. Max. Standzeit der abgedeckten, ungetrübten Lösung 24 Stunden / Tücher-Systeme siehe Anwendung. Bei Unterhalts-Wischdesinfektionen kann die Fläche nach Abtrocknung wieder genutzt werden.

**Bei der Schlusdesinfektion lt. VAH / RKI-Listen die Flächen erst nach Einhaltung der gesamten Einwirkzeit wieder nutzen.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.



Reinigung				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - bei sichtbarer Verschmutzung - nach WC-Benutzung - vor Pausen und Dienstschluss 	Lotio Med Soft Professional & Care	gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - mit Waschlotion und Wasser die Hände waschen - gründlich mit Einmalpapier abtrocknen
		Lotio Med Sensitive Professional & Care	gebrauchsfertig	



Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion	vor: - Patientenkontakt - aseptischen Tätigkeiten nach: - Patientenkontakt - Kontakt mit kontaminiertem Material - Kontakt mit der Patientenumgebung bei Clostridium difficile: - Hygienische Händedesinfektion und anschließend Händewaschung vornehmen	OpSept virugon®	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> - ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben - gleichmäßig verreiben - auf Fingerkuppen und Nagelbett besonders achten - während der Einwirkzeit mit Desinfektionsmittel feucht halten
Hautdesinfektion	- talgdrüsenarme und talgdrüsenreiche Haut			Einwirkzeiten nach Herstellerangaben
Schleimhautdesinfektion	- z. B. vor Blasenkatheterisierung			<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung nach Pflegestandard - Schleimhautdesinfektion mit sterilen Tupfern durchführen



Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händepflege / Hautschutz	- so oft, wie möglich	Lotio Lind Professional & Care	gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - Hände sorgfältig eincremen - Produkte siehe „Hautschutzplan“
		Lotio Protect Professional & Care	gebrauchsfertig	

Datum Erstellung	Unterschrift	Datum Prüfung	Unterschrift
Datum Freigabe	Unterschrift		

Desinfektionsplan Stationäre Pflege



Desinfektion Fläche*		Konzentration / Einwirkzeit			WIE
WAS	WANN	WOMIT			
Arbeitsflächen	Arbeitsflächen: - vor aseptischen Tätigkeiten - nach Gebrauch/Kontamination	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - feucht abwischen - nicht nachtrocknen - Handschuhe tragen	
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute		
PC-Tastatur, Monitor, Visitenwagen	PC-Tastatur / Monitor: - arbeitstäglich - nach Kontamination	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	desinfizierend abwischen - feucht abwischen - nicht nachtrocknen - Handschuhe tragen	
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute		
Verband-, Wäsche-, Tee-, Pflegewagen	Lagerflächen, innen: - 1x wöchentlich nach Ausräumen	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	desinfizierend abwischen - feucht abwischen - nicht nachtrocknen - Handschuhe tragen	
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute		
Schränke / Kühlschränke	- innen 1x monatlich - außen 1x wöchentlich	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- nach Ausräumen feucht aus- bzw. abwischen - feucht abwischen - nicht nachtrocknen - Handschuhe tragen	
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute		
offene Regale	1x wöchentlich	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- nach Ausräumen feucht aus- bzw. abwischen - feucht abwischen - nicht nachtrocknen - Handschuhe tragen	
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute		
Geräte: RR- Geräte, Stethoskope, Perfusoren, Infusomaten	- unmittelbar nach Gebrauch - nach Kontamination - Gehäuse täglich	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - feucht abwischen - nicht nachtrocknen - Handschuhe tragen	
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute		
Schluss- / Wisch-Desinfektion lt. VAH/RKI **	- nach speziellen Erregern	ausgewiesene Mittel laut Listen		- siehe Liste Schluss- / Wischdesinfektion lt. VAH/ RKI	



Desinfektion Instrumente**				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Einweginstrumente	- nach Gebrauch			- in den Kanülenabwurfbehälter abwerfen - keine Wiederverwendung / keine Aufbereitung !

Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Schutzhandschuhe	- gezieltes Tragen, wenn Kontamination erwartet wird			Verhindert nicht den Keimdurchtritt. Nach dem Ablegen ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.
Schutzkittel, Schürze	- Schutz der Dienstkleidung vor Durchfeuchtung oder Verschmutzung			Über der Dienstkleidung tragen und nach Gebrauch entsorgen.
Mund-Nasen-Schutz	- Schutz vor Übertragungen durch Tröpfchen			Auf korrekten Sitz der Maske achten. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
FFP2-Maske	- Schutz vor aerogen übertragbaren Erregern			Auf korrekten Sitz der Maske achten, ggf. testen. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
Schutzbrillen	- Schutz vor Übertragungen durch Tröpfchen - Schutz der Augen beim Umgang mit Chemikalien			Auf einen korrekten Sitz achten. Vor dem Abnehmen ist unbedingt eine Händedesinfektion durchführen.

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift