

Desinfektionsplan Zahnarztpraxis



Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Reinigung				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - bei sichtbarer Verschmutzung - nach WC- Benützung - vor Pausen und Dienstschluss 	<ul style="list-style-type: none"> Lotio Med Soft Professional & Care Lotio Med Sensitive Professional & Care 	<ul style="list-style-type: none"> gebrauchsfertig gebrauchsfertig 	<ul style="list-style-type: none"> - mit Waschlotion und Wasser die Hände waschen - gründlich mit Einmalpapier abtrocknen

Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion	<p>vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patientenkontakt - aseptischen Tätigkeiten <p>nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patientenkontakt - Kontakt mit kontaminiertem Material - Kontakt mit der Patientenumgebung 	OpSept virugon*	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> - ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben - gleichmäßig für die Dauer von 30 Sekunden verreiben - auf Fingerkuppen und Nagelbett besonders achten!

Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händepflege / Hautschutz	<ul style="list-style-type: none"> - so oft, wie möglich - mind. Arbeitstäglich 	<ul style="list-style-type: none"> Lotio Lind Professional & Care Lotio Protect Professional & Care 	<ul style="list-style-type: none"> gebrauchsfertig gebrauchsfertig 	<ul style="list-style-type: none"> - Hände sorgfältig eincremen

Desinfektion Fläche*				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsflächen / PC-Tastatur - Schränke - Behandlungsstuhl 	<p>Arbeitsflächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vor aseptischen Tätigkeiten - nach Gebrauch / Kontamination <p>Lagerflächen (innen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x wöchentlich nach Ausräumen <p>Behandlungsstuhl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nach jeder Behandlung / Untersuchung 	<ul style="list-style-type: none"> Spray In QF wipes Spray In QF 	<ul style="list-style-type: none"> gebrauchsfertig / 1 Minute gebrauchsfertig / 1 Minute 	<ul style="list-style-type: none"> - feucht abwischen - nicht nachtrocknen - Handschuhe tragen
Dental Kamera	- unmittelbar nach Gebrauch			<ul style="list-style-type: none"> - Nebelfeucht abwischen - nicht nachtrocknen
<ul style="list-style-type: none"> - Dentaleinheit - Wasserführende Systeme 	<ul style="list-style-type: none"> - täglich Arbeitsbeginn / Arbeitsende - nach jedem Patienten 	Spülen mit Wasser (Dentaleinheit)	2 Min. / 20 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> - Spülen durch Funktion der Dentaleinheit (alle Entnahmestellen inkl. Mundglasfüller) - Herstellerangaben beachten
Absaugung, Öffnungen und Schläuche	<ul style="list-style-type: none"> - nach jedem Patienten - täglich bei Arbeitsende 	<ul style="list-style-type: none"> Spray In QF wipes Spray In QF 	<ul style="list-style-type: none"> gebrauchsfertig / 1 Minute gebrauchsfertig / 1 Minute 	<ul style="list-style-type: none"> - Nebelfeucht abwischen - nicht nachtrocknen - Wechsel von Kupplungen und Absaugkanüle nach jedem Patienten

Datum Erstellung	Unterschrift	Datum Prüfung	Unterschrift
Datum Freigabe	Unterschrift		

Desinfektionsplan Zahnarztpraxis



Desinfektion Fläche*		Konzentration / Einwirkzeit		WIE
WAS	WANN	WOMIT		
Boden	- täglich nach Arbeitsende	Beta Guard rfu	gebrauchsfertig / 1 Minute	- täglich feucht wischen - bei sichtbarer Kontamination mit Blut/ Speichel mit Flächendesinfektionsmittel oder getränktem Einmaltuch aufnehmen



AUFBEREITUNG Medizinprodukte / Instrumente				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
	Vorreinigung			- siehe Hygieneplan
	Reinigung			- siehe Hygieneplan
	Desinfektion			- siehe Hygieneplan
	Sterilisation			- siehe Hygieneplan

Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Schutzhandschuhe	- gezieltes Tragen, wenn Kontamination erwartet wird			Verhindert nicht den Keimdurchtritt. Nach dem Ablegen ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.
Schutzkittel, Schürze	- Schutz der Dienstkleidung vor Durchfeuchtung oder Verschmutzung			Über der Dienstkleidung tragen und nach Gebrauch entsorgen.
Mund-Nasen-Schutz	- Schutz vor Übertragungen durch Tröpfchen			Auf korrekten Sitz der Maske achten. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
FFP2-Maske	- Schutz vor aerogen übertragbaren Erregern			Auf korrekten Sitz der Maske achten, ggf. testen. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
Schutzbrillen	- Schutz vor Übertragungen durch Tröpfchen - Schutz der Augen beim Umgang mit Chemikalien			Auf einen korrekten Sitz achten. Vor dem Abnehmen ist unbedingt eine Händedesinfektion durchführen.

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift